

**CHARLA DE 5 MINUTOS UNAP N° 20****“LA FIEBRE AMARILLA”****I. INTRODUCCIÓN**

La fiebre amarilla ha resurgido como una preocupación significativa de salud pública en Perú durante 2025, especialmente en las regiones amazónicas. Los casos confirmados entre la semana epidemiológica 1 y la 15 de 2025, se han confirmado 32 casos de fiebre amarilla en humanos, incluyendo 11 muertes. Las regiones afectadas donde los casos se han reportado son en los departamentos de Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto y San Martín.

II. CONTENIDO**Definición:**

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos infectados, como el *Haemagogus*.

Síntomas:

Varían desde leves hasta graves, y generalmente aparecen entre 3 y 6 días después de la picadura de un mosquito infectado.

Fase inicial (fase aguda)	Fase tóxica
Los síntomas pueden durar entre 3 y 4 días: - Fiebre alta - Escalofríos - Dolor de cabeza intenso - Dolores musculares (especialmente en la espalda) - Náuseas y vómitos	- Ictericia (piel y ojos amarillos) - Dolor abdominal - Sangrado de encías, nariz o del tracto digestivo - Vómitos con sangre - Insuficiencia hepática o renal - Shock y coma en casos severos

¿Cómo podemos prevenir?

Vacunación (la medida más efectiva)	Protección contra picaduras de mosquitos	Eliminar criaderos de mosquitos	Educación y vigilancia sanitaria
- Personas que viven en o viajan a zonas de riesgo (como la Amazonía peruana: Loreto, Ucayali, Madre de Dios, etc.). - Una sola dosis proporciona inmunidad de por vida.	Usar repelente, ropa de manga larga, pantalones largos, colores claros, usar mosquiteros.	Evitar agua estancada, tapar los depósitos de agua, limpieza regular de contenedores donde se almacena agua.	- Campañas de información sobre la enfermedad y prevención. - Vigilancia epidemiológica para detectar y contener brotes.